

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects copyrights-free medical documents for non-lucrative use.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for some content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however, we are not able to contact all the authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on:
facadm16@gmail.com

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.


Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.



CERVELET

Introduction

Petit cerveau de la motricité automatique temporelle
Plissé, corticalisé



Trois origines phylogénétiques
Trois lobes cérébelleux
Trois faces
Trois couches corticales
Trois paires de pédoncules cérébelleux
Trois fonctions



14/05/2017

CERVELET: Généralités

Cervelet est un centre nerveux qui assure la régulation motrice.

Il reçoit les informations de tous les segments du système nerveux: moelle spinale, tronc encéphalique et cerveau.

Il est situé dans la fosse crânienne postérieure (fosse cérébelleuse).

En arrière du tronc encéphalique et au dessous du cerveau.

Il est en connexion avec la moelle allongée, le pont et le mésencéphale par l'intermédiaire des pédoncules cérébelleux.


Assure :




L'équilibre

La régulation du tonus musculaire

La coordination des mouvements

BOITE CRANIENNE : ENCEPHALE : vue latérale



COUPE FRONTALE DU CRANE : loge cérébrale postérieure**Vue latérale gauche****vue latérale gauche du tronc cérébral****Coupe sagittale du tronc encéphalique****CERVELET**

14/05/2017


CERVELET : description

Présente à décrire 3 faces:

Supérieure : répond à l'encéphale dont elle est séparée par la tente du cervelet

Inférieure : présente dans sa partie médiane une dépression profonde séparant les hémisphères dans laquelle s'encastre le tronc encéphalique. C'est la vallécule du cervelet, ses parties latérales et postérieure répondent à l'os occipital.

Antérieure : elle est appliquée contre le tronc encéphalique et forme le toit du 4^e ventricule. De ses parties latérales partent les pédoncules cérébelleux supérieur, moyen et inférieur.



CERVELET TRONC ENCEPHALIQUE NERFS CRANIENS

Dimensions

Verticalement 5cm

Avant arrière 5 à 6cm


Transversalement 8 à 10 cm

Poids 140 grs

Constitution

Vermis

Hémisphères



CERVELET : division anatomique

Le cervelet est formé d'une masse fissurée, le corps du cervelet, unie au tronc encéphalique par les pédoncules cérébelleux.

Corps du cervelet formé:

1 partie médiane étroite le **vermis**

2 parties latérales volumineuses les **hémisphères cérébelleux**

L'ensemble forme 3 lobes : antérieur, postérieur et flocculo-nodulaire.



La fissure primaire sépare les lobes antérieur et postérieur.



La fissure postéro-latérale sépare les lobes postérieur et flocculo-nodulaire.

La fissure horizontale marque la limite entre la face supérieure et la face inférieure.

Chaque lobe cérébelleux est divisé en lobules.


14/05/2017

CERVELET : les lobes**CERVELET : DIVISION ANATOMIQUE****CERVELET :vue antérieure**



14/05/2017

Cervelet : coupe horizontale: les noyaux



LOBE ANTERIEUR
PALEOCEREBELLUM
 Lingula- Lobe central
 Culmen- Pyramide Uvula

LOBE FLOCCULO-
NODULAIRE
ARCHEOCEREBELLUM


LOBE POSTERIEUR
NEOCEREBELLUM
 (Déclive – Follum- Tuber



CERVELET : DIVISION FONCTIONNELLE

CERVELET SYSTEMATISATION

CORTEX VERMIS	CORTEX DES HEMISPHERES	NOYAUX CENTRES	TERRITOIRE FONCTIONNEL
NODULUS	FLOCCULUS	NOYAUX DU TOIT	ARCHEO-CEREBELLUM
LINGULA LOBE CENTRAL CULMEN PYRAMIDE UVULA	FREINS LINGULA A LOBULE CENTRAL QUADRILATERE ANT LOBULES GRACILE DIGASTRIQUE TONSILLE	N INTERPOSE GLOBULEUX EMBOLIFORME	PALEO-CEREBELLUM
DECLIVE FOLIUM TUBER	QUADRILATERE-POST SEMI-LUNAIRE SUP SEMI-LUNAIRE INF	NOYAU DENTELE	NEO-CEREBELLUM

DIVISIONS FONCTIONNELLES DU CERVELET (Lobes)






Divisions fonctionnelles du cervelet

Les subdivisions fonctionnelles du cervelet ont leurs fondements dans l'origine de leur afférences et la destination de leurs projections.

On peut différencier sur le plan anatomo-fonctionnel le cervelet en :


- **Vestibulo-cerebellum** correspondant aux lobes flocculo-nodulaires ;
- **Spino-cerebellum** comprenant le vermis et le cervelet intermédiaire ;
- **Cerebro-cerebellum** correspondant aux hémisphères cérébelleux.



DIVISIONS FONCTIONNELLES DU CERVELET

CERVELET : DIVISION FONCTIONNELLE

NEOCEREBELLUM (rose)
noyau dentelé
Cortex cérébelleux



PALEOCEREBELLUM (jaune)
noyaux emboliforme globuleux
cortex paravermien

ARCHEOCEREBELLUM (vert)
Vermis + noyaux fastigiaux
Lobe flocculo-nodulaire

SYSTEMATISATION : ARCHEOCEREBELLUM - EQUILIBRE

A/ VOIES AFFERENTES

Départ sensoriel: cellules épithéliales ciliées du labyrinthe membraneux par deux systèmes:

- Celui des canaux semi-circulaires
- Celui des otolithes de l'utricule et du saccule

1. Nerf vestibulaire

2. Noyaux vestibulaires

Deiters
Schwalbe
Bechterew


3. Fx vestibulo-cérébelleux

4. VOR: voies optiques réflexes

B/ CENTRES

Lobe flocculo-nodulaire


Noyaux du toit (fastigiaux)



SYSTEMATISATION : ARCHEOCEREBELLUM - EQUILIBRE

C/ VOIES EFFERENTES

4. Fx cérébello-vestibulaires direct et croisé
 5. Fx vestibulo-spinaux médial et latéral
 6. Fx vestibulo-mésencéphalique
- BLP: Bandelette longitudinale postérieure
- VI, IV, III : Nerfs occulo-moteurs



B/ CENTRES

- Lobe flocculo-nodulaire (LFN)
- Noyaux du toit (NT)

SYSTEMATISATION: PALEOCEREBELLUM :Tonus musculaire

A/ VOIES AFFERENTES

Sensibilité profonde inconsciente

1. Fx spino-cérébelleux ventral (Flechsig)
2. Fx spino-cérébelleux dorsal (Gowers)

Sensibilité profonde consciente


3. Fx sensitivo-cérébelleux Von monakow

V: Fx de la sensibilité profonde venant des noyaux sensitifs du tronc encéphalique et en particulier du noyau du trijumeau

Sensibilité interoceptive

OB : Olive bulbaire

4. Fx olivo-cérébelleux



B/ CENTRES

- Lobe antérieur du cervelet (LA)
- Noyau interposé (emboliforme et globuleux)

NVM : Noyau de Von monakow (relais de la voie de G et B)

SYSTEMATISATION : ARCHEOCEREBELLUM - EQUILIBRE

C/ VOIES EFFERENTES


4. Fx cérébello-vestibulaires direct et croisé

5. Fx vestibulo-spinaux médial et latéral

6. Fx vestibulo-mésencéphallique

BLP: Bandelette longitudinale postérieure

VI, IV, III : Nerfs oculo-moteurs



B/ CENTRES

Lobe flocculo-nodulaire (LFN)

Noyaux du toit (NT)

SYSTEMATISATION: PALEOCEREBELLUM :Tonus musculaire

A/ VOIES AFFERENTES

Sensibilité profonde inconsciente

1. Fx spino-cérébelleux ventral (Flechsig)

2. Fx spino-cérébelleux dorsal (Gowers)

Sensibilité profonde consciente


3. Fx sensitivo-cérébelleux Von monakow

V: Fx de la sensibilité profonde venant des noyaux sensitifs du tronc encéphalique et en particulier du noyau du trijumeau

Sensibilité interoceptive

OB : Olive bulbaire

4. Fx olivo-cérébelleux



B/ CENTRES

Lobe antérieur du cervelet (LA)


Noyau interposé (emboliforme et globuleux)

NVM : Noyau de Von monakow (relais de la voie de G et B)

SYSTEMATISATION: PALEOCEREBELLUM :Tonus musculaire

C/ VOIES EFFERENTES

5. Fx dentato-rubrique
NR: Noyau rouge
6. Fx rubro-spinal
7. Fx cérébello-olivaire
OB: olive bulbaire
8. Fx central de la calotte
(Motricité extra-pyramidale)
9. Fx olivo-spinal



B/ CENTRES

Lobe antérieur du cervelet (LA)
Noyaux emboliforme et globuleux

SYSTEMATISATION : NEOCEREBELLUM: Coordination motrice

A/ VOIES AFFERENTES

1. Voie cortico-ponto-cérébelleuse
de Turck meynert

Cortex: frontal, pariétal, temporal
occipital.

NP: Noyaux du pont



B/ CENTRES

Lobe postérieur: Déclive
Folium
Tuber
Noyau dentelé

SYSTEMATISATION : NEOCEREBELLUM: Coordination motrice

C/ VOIES EFFERENTES


2. Fx dentato-rubro-thalamique

3. Fx rubro-spinal

NL: noyau lenticulaire

a: Fx central de la calotte (fxcc)

b: Fx pallidal de la pointe (fxpp)



B/ CENTRES

Lobe postérieur: déclive - folium - tuber.
Noyau dentelé

SYNDROME CEREBELLEUX:

Les atteintes du cervelet situé en dérivation sur les voies de la motricité statique et dynamique se traduisent par le syndrome cérébelleux:

1) **La dysmétrie**: trouble de l'exécution du mouvement

Elle est due à une incoordination des muscles axiaux et appendiculaires entraînant une hypermétrie au cours d'un mouvement volontaire la correction du déplacement est généralement excessive; le mvt se fait avec trop de rapidité et d'exagération d'amplitude.

1) **La dysarthrie**

c'est un trouble de l'expression de la parole et de l'élocution par trouble de la coordination des muscles de la phonation (tonalité augmentée ou diminuée, parole scandée aboyante).

3) **Le nystagmus**

Il correspond à une incoordination des muscles de l'œil entraînant des mouvements saccadés de celui-ci.

4) **L'hypotonie**

Elément essentiel du syndrome augmentation du ballant lors des mvts passifs. La diminution du tonus musculaire donne un aspect de sujet désarticulé (comme un état d'ébriété), elle entraîne une déviation de la marche et une tendance à la chute du côté de la lésion (élargissement du polygone de sustentation).

SYNDROMES TOPOGRAPHIQUES:

Syndrome vermien: caractérisé par l'importance des troubles de la statique résultant principalement des troubles de la coordination des muscles axiaux (syndrome cérébelleux statique).

Syndrome latéral: ou hémisphérique caractérisé par une hypotonie de repos et par l'incoordination des membres homolatéraux à la lésion (syndrome cérébelleux cinétique)

En conclusion:

Se tenir debout, marcher, exécuter un mvt, écrire, parler, nécessitent l'intégrité du cervelet et de ses circuits.

ATAXIE CEREBELLEUSE:

Manque de coordination des mouvements volontaires liée à une atteinte du système nerveux : moelle, cervelet, nerfs périphériques (pas d'atteinte des muscles)

ADIADOCOCINESIE:

Troubles de l'exécution du mouvement dans le temps (dyschronométrie)

DYSMETRIE:

Troubles de l'exécution du mouvement dans l'espace (hypermétrie asynergie)

SYNDROMES TOPOGRAPHIQUES:

Syndrome vermien: caractérisé par l'importance des troubles de la statique résultant principalement des troubles de la coordination des muscles axiaux (syndrome cérébelleux statique).

Syndrome latéral: ou hémisphérique caractérisé par une hypotonie de repos et par l'incoordination des membres homolatéraux à la lésion (syndrome cérébelleux cinétique)

En conclusion:

Se tenir debout, marcher, exécuter un mvt, écrire, parler, nécessitent l'intégrité du cervelet et de ses circuits.